



Hennengold

Ergänzungsfuttermittel für Geflügel

- ✓ **Vermindert Brucheier**
- ✓ **Reduziert Federfressen**
- ✓ **Aufzucht & Mauserhilfe**

Hennengold ist ein Ergänzungsfuttermittel mit Mineralien und Spurenelementen als Futterzusatz. **Hennengold** vermindert durch Mangelversorgung verursachte Wind- und Brucheier, gleicht Mangelerkrankungen aus und vermindert das daraus resultierende Eier und Federfressen. Durch den hohen Gehalt an Methionin und Cholin ist es besonders während der Wachstums- und Mauserzeit zu empfehlen, um ein makelloses Federkleid zu erhalten.

Zusammensetzung: Wasser, Calciumchlorid, Traubenzucker.

Analytische Bestandteile: Rohprotein 1,2%, Rohfett 0,3%, Rohfaser 0,0%, Rohasche 10,7%, Calcium 4,0%, Natrium 0,05%, Phosphor 0,01%, Methionin 1,98%, Lysin 0,0%, Feuchte 76,0%.

Zusatzstoffe je 1.000ml: **Aminosäuren:** DL-Methionin (technisch rein) (3c301) 19.800mg. **Vitamine:** Cholinchlorid (3a890) 3.200mg. **Spurenelemente:** Eisen/ Eisen(III)-chlorid- Hexahydrat (3b102) 1.700mg, Mangan/ Mangan(II)-chlorid, Tetrahydrat (3b501) 900mg, Zink/ Zinkchlorid, wasserfrei (3b602) 2.800mg. **Konservierungsstoffe:** Calciumpropionat (E282) 1.000mg.

Fütterungsempfehlung: 20ml pro Liter Trinkwasser.

Bei Wind und Brucheiern, sowie Mangelerkrankungen: Täglich mindestens über 3 Wochen. Während Aufzucht und Mauser: Zweimal wöchentlich.

Dieses Ergänzungsfuttermittel darf auf Grund seines gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehaltes an Spurenelementen nur an Geflügel mit bis zu 1 v.H. der Gesamtration verfüttert werden.

Lagerungshinweis: Dicht verschlossen, vor Licht geschützt und nicht über +25°C lagern!

Dr. Hesse Tierpharma GmbH & Co. KG

Kieler Straße 36a

D-25551 Hohenlockstedt

Tel.: +49 4826 8610-0

Fax +49 4826 8610-10

info@roehnfried.de



Seite 2 von 5

V18 11.21

02.11.2021

Zulassungsnummer: α DE SH 1 00023



Hennengold

Complément alimentaire pour volailles

Hennengold est un complément alimentaire avec des minéraux et des oligoéléments comme additifs. En comblant la carence, **Hennengold** diminue les œufs sans coquille ou cassés, compense les déficiences, réduit donc le picage qui en résulte et le fait de manger les œufs. Grâce à la forte teneur en méthionine et choline, il est particulièrement recommandé pendant la période de croissance et de mue, afin d'obtenir un plumage impeccable.

Composition: Eau, chlorure de calcium, dextrose.

Contenances analytiques: Protéine brute 1,2%, grasses brutes 0,3%, cellulose brute 0,0%, cendres brutes 10,7%, calcium 4,0%, sodium 0,05%, phosphore 0,01%, méthionine 1,98%, lysine 0,0%, humidité 76,0%.

Additifs par 1.000ml: **Les acides aminés:** DL-Méthionine (techniquement pur) (3c301) 19.800mg. **Vitamines:** Cholinchloride (3a890) 3.200mg. **Oligoéléments:** Fer/ chlorure de fer(III) hexahydraté (3b102) 1.700mg, manganèse/ chlorure de manganèse(II) tétrahydraté (3b501) 900mg, zinc/ Chlorure de zinc anhydre (3b602) 2.800mg. **Conservateurs:** Propionate de calcium (E282) 1.000mg.

Recommandations alimentaires: 20ml par litre d'eau potable.

En cas d'œufs sans coquille ou cassés et déficiences: Au moins une fois par jour pendant 3 semaines. Pendant l'élevage et la mue: Deux fois par semaine

En raison de sa plus forte teneur en oligoéléments que les aliments complets, ce complément alimentaire ne doit être administré aux volailles qu'à hauteur de 1% maximum de la ration totale.

Remarques concernant le stockage: Conserver hermétiquement fermé, à l'abri de la lumière et à une température ne dépassant pas +25°C!



Hennengold

Feed supplement for poultry

Hennengold is a feed supplement with minerals and trace elements as a feed additive. **Hennengold** reduced by insufficient supply which causes broken eggs, compensates for deficiencies and reduce the resulting eggs and feather eating. Due to the high content of methionine and choline, it is particularly recommended during the growth and moulting period, to obtain a flawless plumage.

Composition: Water, calcium chloride, dextrose.

Analytical Ingredients: Crude protein 1.2%, crude fat 0.3%, crude fiber 0.0%, crude ash 10.7%, calcium 4.0%, sodium 0.05%, phosphor 0.01%, methionine 1.98%, lysine 0.0% moisture 76.0%,

Additives per 1.000ml: **Amino acids:** DL-methionine (technically pure) (3c301) 19,800mg. **Vitamins:** Choline chloride (3a890) 3,200mg. **Trace elements:** Iron/ iron(III) chloride, hexahydrate (3b102) 1,700mg, manganese/ manganese(II) chloride, tetrahydrate (3b501) 900mg, zinc/ zinc chloride, anhydrous (3b602) 2,800mg. **Preservatives:** Calcium propionate (E282) 1,000mg.

Feeding recommendation: 20ml per liter of drinking water.

In wind and broken eggs, and symptoms of deficiency: Daily at least over 3 weeks. During rearing and moulting: Two times per week.

This supplement may be due to its relation to complete feed higher content of trace elements only in poultry up to 1 per cent the total ration to be fed.

Storage: Tightly closed, protected from light and does not exceed +25°C!

Hennengold

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla gołębi

Hennengold jest mieszanką paszową zawierającą minerały i pierwiastki śladowe. **Hennengold** zmniejsza ilość miękkich skorupki oraz pękniętych jaj spowodowanych niedoborami. Ze względu na wysoką zawartość metioniny i cholicy jest szczególnie polecany w okresie odchowu i pierzenia w celu utrzymania nieskazitelnej upierzenia.

Skład: Woda, chlorek wapnia, cukier gronowy.

Składniki analityczne: Białko surowe 1,2%, tłuszcz surowy 0,3%, włókno surowe 0,0%, popiół surowy 10,7%, wapń 4,0%, sód 0,05%, fosfor 0,01%, metionina 1,98%, lizyna 0,0% wilgotność 76,0%.

Dodatki na 1.000ml: Aminokwasy: DL-metionina (technicznie czysta) (3c301) 19.800mg. Witaminy: Chlorek cholicy (3a890) 3,200mg. **Pierwiastki śladowe:** żelazo/chlorek żelaza (III) heksahydrat (3b102) 1.700mg, mangan/chlorek manganu (II), tetrahydrat (3b501) 900mg, cynk/chlorek cynku, bezwodny (3b602) 2,800mg. **Konserwanty:** Propionian wapnia (E282) 1.000mg.

Zalecane stosowanie: 20ml na litr wody pitnej.

W przypadku słabych skorupki jaj, a także objawów niedoboru: Codziennie przez co najmniej 3 tygodnie. Podczas odchowu i pierzenia: dwa razy w tygodniu.

Ze względu na wyższą zawartość pierwiastków śladowych w porównaniu z paszami pełnoporcjowymi, ta mieszanka paszowa uzupełniająca może być podawana drobiowi w ilości do 1% dawki pokarmowej.

Przechowywania: Przechowywać szczelnie zamknięte, chronić przed światłem i nie przekraczać temperatury +25°C!