

Nährwerte	Pro Tagesportion (1 Tablette)	NRV*
Beta-Carotin entspricht Vitamin A	2 mg 333,3 µg	- 42%
Vitamin B1	2,4 mg	218%
Vitamin B2	2,6 mg	186%
Vitamin B6	3 mg	214%
Vitamin B12	12 µg	480%
Niacin	16 mg	100%
Pantothensäure	15 mg	250%
Biotin	100 µg	200%
Folsäure	300 µg	150%
Vitamin C	180 mg	225%
Vitamin D3	20 µg (= 800 IE)	400%
Vitamin E	30 mg	250%
Vitamin K1	100 µg	133%
Kalzium	200 mg	25%
Magnesium	100 mg	27%
Zink	4 mg	40%
Eisen	12 mg	86%
Mangan	1,5 mg	75%

Kupfer	0,8 mg	80%
Chrom	100 µg	250%
Molybdän	50 µg	100%
Jod	100 µg	66%
Selen	55 µg	100%
Beeren- und Früchteextrakt	50 mg	-

*NRV = Nutrient reference value (Nährstoffbezugswert)

Anwendung

Täglich 1 Tablette mit etwas Flüssigkeit einnehmen.

Zutaten

Calciumcarbonat, L-Ascorbinsäure, Füllstoffe (Cellulose, vernetzte Natriumcarboxymethylcellulose), Magnesiumoxid, Magnesiumbisglycinat, Überzugsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose, Calciumcarbonat, Polydextrose, Talk, Glycerin), Trennmittel (Speisefettsäuren, Siliciumdioxid, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Eisenfumarat, Beeren- und Früchteextrakt (2.9%, Heidelbeere, Brombeere, Erdbeere, Cranberry, Traube, Granatapfel), Gemischte Tocopherole, Zinkbisglycinat, D-alpha-Tocopherylsäuresuccinat, Calcium-D-pantothenat, Nicotinamid, Manganbisglycinat, Pyridoxal-5'-phosphat, Farbstoffe (Riboflavin), Thiaminmononitrat, Kupferbisglycinat, Riboflavin, Beta-Carotin, Chrompicolinat, Pteroylglutaminsäure, D-Biotin, Natriumselenat, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.

Zusätzliche Informationen

Bei Raumtemperatur lagern. Ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.

Entwickelt in der Schweiz, hergestellt in den USA.

Wenn sich nach der Einnahme von Burgerstein Sport der Urin gelb verfärbt, so ist das auf das Vitamin B2 (Riboflavin) in den Tabletten zurückzuführen, welches mit dem Urin ausgeschieden wird. Dies ist ein ganz normaler Prozess. Die Einnahme muss deshalb nicht gestoppt werden.

Patientinnen und Patienten, die Antikoagulantien einnehmen, sollten vor der Einnahme von Vitamin K-Präparaten ihre Ärztin oder Arzt konsultieren.